Director: Bioq. Ángel J. Kossman
Co-directora: Bioq. Alejandra V. Kossman
Integrante de la Red A.L.A.C y Fundación A.L.A.C

ALAC
IRAM IQNET GESTIÓN DE LA CALIDAD RI 9000-6006 IRAM-ISO 9001:2015

INSTRUCTIVO PARA RECOLECCION DE MUESTRA
CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA Y POST ESTÍMULO

Durante los 2 días previos a la prueba realizar una dieta rica en hidratos de carbonos (pan, pastas, fideos, arroz, papas, azúcar, dulces, pudiendo acompañar con cualquier otra comida y bebida).

» 8 horas antes de la extracción suspender la ingesta de hidratos de carbono (harinas, dulces, azúcar, papas).

» Concurrir al laboratorio con un ayuno de 8 horas.

» Para esta prueba se le realizará, en primer lugar, un test rápido para determinar la glucosa basal y definir si es apto para el estudio o no.
En caso de que la glucosa esté en un rango aceptable, se procederá a realizar dos extracciones de sangre.

» En el laboratorio se le dará una solución de glucosa, que deberá tomar en presencia de la persona que le realizó la primera extracción.

» Deberá permanecer en el laboratorio durante las siguientes 2 horas, en reposo. Durante este período NO puede tomar ni comer nada excepto agua. SÍ puede ir al baño.

“La toma de muestra es el principio de un buen análisis.”

ITCH-08 Rev-06

REDUCÍ - REUSA - RECICLA
IDAC LABORATORIOS